

San Andrés y sus avances en sanidad pecuaria

En el 2010, el Instituto realizó en San Andrés y Providencia un muestreo sero-epidemiológico para peste porcina clásica y brucelosis, y la aplicación de tuberculina en bovinos de toda la población animal.

En relación con la población porcina se alcanzó una cobertura de 100%, igualmente en lo que se relacionó con brucelosis bovina se tomaron 470 muestras de una población aproximada de 530 animales y se tuberculinizaron 365 animales mayores de 12 meses de edad, obteniéndose resultados negativos.

El objetivo principal de este muestreo es que al resultar negativo la población animal a estas diferentes patologías, San Andrés sea certificado como zona libre sin vacunación de estas enfermedades y así se abran las puertas para que se movilicen animales de otras regiones con características similares y se pueda hacer mejoramiento genético.

Plan de contingencia para contrarrestar las cochinillas

Durante el presente año el Instituto elaboró el plan para el manejo y mitigación del riesgo ocasionado por la chinche acanalada (*crypticerya multicatrices*) en San Andrés isla y la cochinilla rosada del hibisco (*maconellcocus hirsutus*) en Providencia isla.

Las labores del ICA determinaron que en la cuenca occidental de la Isla de San Andrés se encontró un ataque severo de Chinche acanalada, infestando un área de 180 hectáreas de bosque secundario, especialmente especies ecológicas, arvenses, frutales y ornamentales, en 431 predios. Los sectores de la isla de San Andrés con los puntos críticos de mayor infestación son: Suckey Bay, Cove, Polly hills, Cove sea side, Pepper hill, Lyons hill.

Por su parte, en la Isla de Providencia se encontró la cochinilla rosada infestando en un área de 770 hectáreas, especialmente las especies frutales, ornamentales ecológicas y arvenses. El área afectada equivale a 1.383 predios con igual números de propietarios que corresponde al 37,2 % del área total de la Isla de Providencia. La incidencia y severidad es alta y el 62 % de área de cobertura vegetal restante de esta Isla se encuentra con infestaciones dispersas en sus alrededores.

Los sectores de la isla de Providencia que poseen mayor infestación de la cochinilla rosada son Mountain, Bailey, Rocky point, Old Town, Camp, San Felipe, Caballete, Santa Isabel, Botton House, Santa Catalina.

Prevención en puerto y aeropuerto

El ICA está trabajando en diferentes mecanismos para garantizar el control efectivo de las importaciones de productos agropecuarios que ingresan a la isla y de esta manera proteger la producción agropecuaria de la región y del país.

Dado que aproximadamente el 80 por ciento del pollo y la carne consumidos por los habitantes del departamento son importados de países como Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, el ICA realiza constante vigilancia al ingreso de estos productos, verificando que no traigan consigo enfermedades que pongan en riesgo la salud de las personas y que además atenten contra la sanidad pecuaria.

En este ámbito, en el 2010 el Instituto expidió 869 certificados de inspección sanitaria a productos de origen animal y 486 de origen vegetal, con un peso aproximado de 2.000.000 kilogramos, en ambos casos.

El ICA trabajará de la mano con los importadores de la isla, así como con el gobierno departamental para garantizar la calidad de los productos importados, tanto en lo relacionado con la inocuidad como en la sanidad de dichos productos.