

PLAGAS PRIORIZADAS EN HORTALIZAS

Plagas	Principales hospederos
Roya del ajo y las cebollas (<i>Puccinia allii</i>)	Ajo (<i>Allium sativum</i>) Cebolla de bulbo o cebolla cabezona (<i>A. cepa</i>) Cebolla puerro (<i>A. ampeloprasum</i> var. <i>porrum</i>) Cebolla de rama (<i>A. fistulosum</i>) Cebollín (<i>A. schoenoprasum</i>)
Pudrición de la cebolla (<i>Pectobacterium carotovorum</i>)	Cebolla de rama (<i>A. fistulosum</i>)
Hernia de las crucíferas (<i>Plasmodiophora brassicae</i>)	Col (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>) Col de Bruselas (<i>B. oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>) Coliflor (<i>B. oleracea</i> var. <i>botrytis</i>) Repollo (<i>B. oleracea</i> var. <i>capitata</i>) Brócoli (<i>B. oleracea</i> var. <i>italica</i>) Rábano (<i>Raphanus sativus</i>) Nabo (<i>B. rapa</i> subsp. <i>Rapa</i>)
Pudrición negra (<i>Rhizoctonia fragariae</i>)	Fresa (<i>Fragaria</i> sp.)
Marchitez bacteriana (<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>)	Ají (<i>Capsicum annuum</i>) berenjena (<i>Solanum melongena</i>) pimentón (<i>Capsicum annuum</i>) tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)
Pudrición bacteriana (<i>Pectobacterium chrysanthemi</i>) Pudriciones de raíz (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>F. solani</i> , <i>Penicillium</i> sp.)	Sábila (<i>Aloe vera</i>)