BAT

Boletín de Alertas Tempranas



Alertas Tempranas

Para importaciones pecuarias a Colombia

001

Alertas tempranas

Octubre, 2026

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

BAT
Boletín de Alertas Tempranas

ESPAÑA
PESTE PORCINA AFRICANA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres de todas las edades y razas. Es causada por el virus de la peste porcina africana (VPPA), un virus ADN complejo perteneciente a la familia *Asfaviridae* y único representante del género *Asfivirus*. Actualmente, la enfermedad se encuentra distribuida en más de 50 países de África, Asia y Europa, constituyéndose en una de las principales amenazas para la producción porcina mundial.

Los cerdos domésticos constituyen la principal especie afectada; sin embargo, los jabalíes y cerdos silvestres también son susceptibles y desempeñan un papel importante en la epidemiología de la enfermedad. El período de incubación suele oscilar entre 4 y 19 días.

A la fecha **no existe una vacuna eficaz** disponible contra la PPA, por lo que las medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control de movilización de animales y mercancías constituyen las principales herramientas para prevenir su introducción y diseminación.



Virus de la Peste Porcina Africana
Virus ADN de la familia Asfarviridae, género Asfivirus

RESOLUCIÓN 00031675 DE 2025

Por la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para productos y subproductos de origen porcino procedentes del Reino de España ante la presencia del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en animales silvestres y se dictan otras disposiciones.

BAT
Boletín de Alertas Tempranas

ALEMANIA
PESTE PORCINA AFRICANA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres de todas las edades y razas. Es causada por el virus de la peste porcina africana (VPPA), un virus ADN complejo perteneciente a la familia *Asfaviridae* y único representante del género *Asfivirus*. Actualmente, la enfermedad se encuentra distribuida en más de 50 países de África, Asia y Europa, constituyéndose en una de las principales amenazas para la producción porcina mundial.

Los cerdos domésticos constituyen la principal especie afectada; sin embargo, los jabalíes y cerdos silvestres también son susceptibles y desempeñan un papel importante en la epidemiología de la enfermedad. El período de incubación suele oscilar entre 4 y 19 días.

A la fecha **no existe una vacuna eficaz** disponible contra la PPA, por lo que las medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control de movilización de animales y mercancías constituyen las principales herramientas para prevenir su introducción y diseminación.



Virus de la Peste Porcina Africana
Virus ADN de la familia Asfarviridae, género Asfivirus

RESOLUCIÓN 00034883 DE 2025

Por la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para productos y subproductos de origen porcino procedentes de la República Federal de Alemania ante la presencia del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en animales silvestres y se dictan otras disposiciones.

BAT
Boletín de Alertas Tempranas

ITALIA
PESTE PORCINA AFRICANA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y silvestres de todas las edades y razas. Es causada por el virus de la peste porcina africana (VPPA), un virus ADN complejo perteneciente a la familia *Asfaviridae* y único representante del género *Asfivirus*. Actualmente, la enfermedad se encuentra distribuida en más de 50 países de África, Asia y Europa, constituyéndose en una de las principales amenazas para la producción porcina mundial.

Los cerdos domésticos constituyen la principal especie afectada; sin embargo, los jabalíes y cerdos silvestres también son susceptibles y desempeñan un papel importante en la epidemiología de la enfermedad. El período de incubación suele oscilar entre 4 y 19 días.

A la fecha **no existe una vacuna eficaz** disponible contra la PPA, por lo que las medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control de movilización de animales y mercancías constituyen las principales herramientas para prevenir su introducción y diseminación.



Virus de la Peste Porcina Africana
Virus ADN de la familia Asfarviridae, género Asfivirus

RESOLUCIÓN 00034876 DE 2025

Por la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para productos y subproductos de origen porcino procedentes de la República Italiana, ante la presencia del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en animales silvestres, y se dictan otras disposiciones.

BAT
Boletín de Alertas Tempranas


ESPAÑA
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) es una enfermedad viral que afecta principalmente a bovinos, búfalos y algunos rumiantes silvestres. Se caracteriza por generar fiebre, aparición de nódulos en la piel y las mucosas, inflamación de los ganglios linfáticos, edema, pérdida de condición corporal y, en algunos casos, mortalidad.

La transmisión ocurre principalmente a través de vectores, mientras que el contagio directo entre animales se considera poco eficiente en ausencia de estos. También puede ocasionar importantes afectaciones reproductivas, como abortos en hembras gestantes y alteraciones temporales o permanentes de la fertilidad en los machos.

La vacunación constituye una de las principales estrategias para prevenir y controlar la DNC. Las vacunas vivas atenuadas, especialmente las elaboradas a partir de la cepa Neethling, han demostrado ofrecer altos niveles de protección y contribuir al control de la enfermedad en campo; su aplicación sistemática en la población bovina, acompañada de vigilancia epidemiológica y medidas de bioseguridad, es fundamental para reducir el riesgo de propagación y proteger la sanidad animal.



Virus de Dermatosis Nodular Contagiosa
Virus ADN de la familia Poxviridae, género Capripoxvirus

RESOLUCIÓN 00001129 DE 2026

Por la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para bovinos, bufalinos, productos y subproductos de riesgo susceptibles de transmitir la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa, procedentes del Reino de España, y se establecen otras disposiciones.

BAT
Boletín de Alertas Tempranas


ITALIA
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) es una enfermedad viral que afecta principalmente a bovinos, búfalos y algunos rumiantes silvestres. Se caracteriza por generar fiebre, aparición de nódulos en la piel y las mucosas, inflamación de los ganglios linfáticos, edema, pérdida de condición corporal y, en algunos casos, mortalidad.

La transmisión ocurre principalmente a través de vectores, mientras que el contagio directo entre animales se considera poco eficiente en ausencia de estos. También puede ocasionar importantes afectaciones reproductivas, como abortos en hembras gestantes y alteraciones temporales o permanentes de la fertilidad en los machos.

La vacunación constituye una de las principales estrategias para prevenir y controlar la DNC. Las vacunas vivas atenuadas, especialmente las elaboradas a partir de la cepa Neethling, han demostrado ofrecer altos niveles de protección y contribuir al control de la enfermedad en campo; su aplicación sistemática en la población bovina, acompañada de vigilancia epidemiológica y medidas de bioseguridad, es fundamental para reducir el riesgo de propagación y proteger la sanidad animal.



Virus de Dermatosis Nodular Contagiosa
Virus ADN de la familia Poxviridae, género Capripoxvirus

RESOLUCIÓN 00001437 DE 2026

Por la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para bovinos, bufalinos, productos y subproductos de riesgo susceptibles de transmitir la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa, procedentes de la República Italiana, y se establecen otras disposiciones

BAT
Boletín de Alertas Tempranas

ESPAÑA
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres. Posee una distribución mundial y continúa siendo un problema sanitario en diferentes regiones de África, Asia y Sudamérica. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con aves infectadas o portadoras, así como por la exposición a heces, secreciones respiratorias, agua, alimentos, equipos y prendas contaminadas. Las aves silvestres también pueden actuar como portadoras del virus y favorecer su dispersión.

Las manifestaciones clínicas varían, encontrando dificultad respiratoria, tos, estornudos, diarrea, temblores, parálisis de alas y patas, tortícolis y movimientos circulares. En aves ponedoras puede presentarse una disminución o interrupción de la producción de huevos, acompañada de alteraciones en su forma, color y calidad interna. La mortalidad es variable y, en determinadas circunstancias, puede alcanzar el 100 %.

La vacunación constituye una herramienta fundamental para la prevención y el control de la enfermedad, mediante el uso de vacunas vivas atenuadas o inactivadas, complementadas con medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y notificación oportuna de casos sospechosos.



Virus de la Enfermedad de Newcastle
Paramixovirus Tipo 1 (APMV-1), Familia Paramyxoviridae

RESOLUCIÓN 00000578 DE 2026

"Por medio de la cual se suspende temporalmente la emisión de documentos zoosanitarios de importación (DZI) para aves vivas, material genético, productos y subproductos de riesgo susceptibles de transmitir la enfermedad de Newcastle, procedentes del Reino de España y se dictan otras disposiciones."

BAT
Boletín de Alertas Tempranas


FRANCIA
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La dermatosis nodular contagiosa (DNC) es una enfermedad viral que afecta principalmente a bovinos, búfalos y algunos rumiantes silvestres. Se caracteriza por generar fiebre, aparición de nódulos en la piel y las mucosas, inflamación de los ganglios linfáticos, edema, pérdida de condición corporal y, en algunos casos, mortalidad.

La transmisión ocurre principalmente a través de vectores, mientras que el contagio directo entre animales se considera poco eficiente en ausencia de estos. También puede ocasionar importantes afectaciones reproductivas, como abortos en hembras gestantes y alteraciones temporales o permanentes de la fertilidad en los machos.

La vacunación constituye una de las principales estrategias para prevenir y controlar la DNC. Las vacunas vivas atenuadas, especialmente las elaboradas a partir de la cepa Neethling, han demostrado ofrecer altos niveles de protección y contribuir al control de la enfermedad en campo; su aplicación sistemática en la población bovina, acompañada de vigilancia epidemiológica y medidas de bioseguridad, es fundamental para reducir el riesgo de propagación y proteger la sanidad animal.



Virus de Dermatosis Nodular Contagiosa
Virus ADN de la familia Poxviridae, género Capripoxvirus

RESOLUCIÓN 00001757 DE 2026

Por la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para bovinos, bufalinos, productos y subproductos de riesgo susceptibles de transmitir la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa, procedentes de la República Francesa, y se establecen otras disposiciones.

BAT
Boletín de Alertas Tempranas

ARGENTINA
PRURIGO LUMBAR (SCRAPIE)

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

El prurigo lumbar, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los ovinos y caprinos. Su transmisión ocurre principalmente de la madre a las crías durante o inmediatamente después del parto, por exposición a fluidos y tejidos contaminados. Los animales adultos también pueden infectarse, aunque la transmisión por esta vía es menos frecuente. En los ovinos, la susceptibilidad a la enfermedad está influenciada por factores genéticos.

Presenta un período de incubación prolongado y variable, que generalmente puede extenderse durante varios años. Su duración depende de factores como la genética del animal y la cepa del agente causal. Se considera una enfermedad que no representa riesgo para la salud humana, pero sí un problema de importancia para la sanidad animal y requiere medidas de vigilancia y control en las poblaciones ovinas y caprinas.

Las recomendaciones sanitarias internacionales están orientadas a gestionar los riesgos asociados con la presencia del agente de la enfermedad en los rebaños y en el comercio internacional de animales y sus productos.



Proteína priónica del Prurigo Lumbar
Proteína Priónica Anómala (PrPSc).

RESOLUCIÓN 00008819 DE 2026

Por medio de la cual se suspende temporalmente la emisión de Documentos Zoosanitarios de Importación (DZI) para material genético, productos y subproductos de origen ovino/caprino susceptibles de transmitir el Prurigo Lumbar (Scrapie) procedentes de la República de Argentina y se dictan otras disposiciones.

BAT
Boletín de Alertas Tempranas

BRASIL
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres. Posee una distribución mundial y continúa siendo un problema sanitario en diferentes regiones de África, Asia y Sudamérica. Su transmisión ocurre principalmente por contacto directo con aves infectadas o portadoras, así como por la exposición a heces, secreciones respiratorias, agua, alimentos, equipos y prendas contaminadas. Las aves silvestres también pueden actuar como portadoras del virus y favorecer su dispersión.

Las manifestaciones clínicas varían, encontrando dificultad respiratoria, tos, estornudos, diarrea, temblores, parálisis de alas y patas, tortícolis y movimientos circulares. En aves ponedoras puede presentarse una disminución o interrupción de la producción de huevos, acompañada de alteraciones en su forma, color y calidad interna. La mortalidad es variable y, en determinadas circunstancias, puede alcanzar el 100 %.

La vacunación constituye una herramienta fundamental para la prevención y el control de la enfermedad, mediante el uso de vacunas vivas atenuadas o inactivadas, complementadas con medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y notificación oportuna de casos sospechosos.



Virus de la Enfermedad de Newcastle
Paramixovirus Tipo 1 (APMV-1), Familia Paramyxoviridae

RESOLUCIÓN 00021295 DE 2026

Por medio de la cual se suspende temporalmente la emisión de documentos zoosanitarios de importación (DZI) para aves vivas, productos y subproductos de riesgo susceptibles de transmitir la enfermedad de Newcastle, procedentes del estado de Santa Catarina, Brasil y se dictan otras disposiciones.

BAT

Boletín de Alertas Tempranas

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

País	Agente Patógeno	Enfermedad	Especie (s) afectada (s)	Fecha inicio
España	Virus de la Peste Porcina Africana	Peste Porcina Africana	Suinos	04/12/2025
Alemania	Virus de la Peste Porcina Africana	Peste Porcina Africana	Suinos	30/12/2025
Italia	Virus de la Peste Porcina Africana	Peste Porcina Africana	Suinos	30/12/2025
España	Virus de la Enfermedad de Newcastle	Enfermedad de Newcastle	Aves domésticas	27/01/2026
España	Virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa	Dermatosis Nodular Contagiosa	Bovinos domésticos	04/02/2026
Italia	Virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa	Dermatosis Nodular Contagiosa	Bovinos domésticos	12/02/2026
Francia	Virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa	Dermatosis Nodular Contagiosa	Bovinos domésticos	17/02/2026
Argentina	Proteína Priónica del Prúrigo Lumbar	Prurigo Lumbar (Scrapie)	Ovinos	08/05/2026
Brasil	Virus de la Enfermedad de Newcastle	Enfermedad de Newcastle	Aves domésticas	28/10/2026

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

001 Alertas tempranas

Octubre, 2026

Equipo de Alertas Tempranas
Subgerencia de Protección Fronteriza
Dirección Técnica de Cuarentena Animal

Equipo de Alertas Tempranas

Cargue y creación de las Alertas Tempranas en SISPAP: Jenniffer Fernández Cortés, MVZ, Esp.

Compilación de Resoluciones ICA/CAN: Juan Diego Espinosa Fajardo, MV.

Página web ICA

Página web OMSA

BAT

Boletín de Alertas Tempranas

Las alertas tempranas constituyen una herramienta estratégica para la protección del estatus sanitario pecuario nacional, ya que permiten identificar oportunamente amenazas asociadas a enfermedades animales de importancia económica y sanitaria, facilitando la adopción de medidas preventivas antes de que estas representen un riesgo para la producción, el comercio y la seguridad alimentaria del país.

Un sistema eficaz de vigilancia y alerta temprana fortalece la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias, los productores y los demás actores de la cadena pecuaria, contribuyendo a prevenir la introducción, dispersión y establecimiento de enfermedades transfronterizas que puedan afectar la sanidad animal y el patrimonio pecuario nacional.

"Cada alerta cuenta: prevenir es la mejor defensa."