



Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

#### LA GERENTE GENERAL

# DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial de las conferidas por el artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 1071 de 2015, el artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 4765 de 2008 y

#### CONSIDERANDO:


Que el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA es el responsable de velar por la sanidad agropecuaria del país, a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o enfermedades que puedan afectar las especies animales o vegetales.

Que es deber del ICA adoptar, de acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal.

Que corresponde al ICA coordinar las acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el control, la erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los animales y de sus productos.

Que el ICA para alcanzar los objetivos propuestos en su misión como autoridad sanitaria y contribuir al desarrollo de la industria avícola nacional, debe establecer medidas de vigilancia, control y disminución de prevalencia de las Salmonellas de importancia en salud pública en el territorio nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el capítulo 6.6 del Código Sanitario de los Animales terrestres de la OIE.

Que, para el establecimiento de un sistema de diagnóstico, control y reconocimiento de módulos, granjas y/o plantas de incubación como libres de la infección por Salmonelas paratíficas, así como la implementación de acciones de control y autogestión orientadas a las salmonellas paratíficas, se hace necesario actualizar la normativa, formulando los capítulos para las infecciones en aves de corral por los serovares de Salmonella Enteritidis y Tiphymurium.





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

En virtud de lo anterior.


#### RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OBJETO. Establecer el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional.

ARTÍCULO 2.- CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en la presente resolución, serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción y/o comercialización de aves de corral en Colombia, así como aquellas que produzcan y/o comercialicen biológicos para la especie aviar.

**ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES.** Para efectos de la presente resolución, se establecen las siguientes definiciones:

- 3.1 Aves de corral: Designa todas las aves domesticadas, incluidas las de traspatio, que se utilizan para la producción de carne y huevos destinados al consumo, la producción de otros productos comerciales, la repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas categorías de aves, así como las aves de pelea, independientemente de los fines para los que se utilicen.
- 3.2 Módulo: Unidad epidemiológica independiente, dentro de una granja constituida, debe cumplir con las medidas de bioseguridad e infraestructura contenidas en las resoluciones 3650, 3651 o 3652 de 2014, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.
- 3.3 Mortalidad fresca: Aves muertas que no superen las tres horas después de su deceso y que no hayan sido expuestas al sol directo o altas temperaturas.
- 3.4 Reconocimiento de establecimiento libre de infección por Salmonelas paratificas: Publicación realizada por el ICA en su página web mediante la cual se reconoce una granja, módulo y/o planta de incubación como libre de la infección por los serovares Salmonella Enteritidis y Tiphymurium.
- 3.5 Prueba diagnóstica: Procedimiento analítico aplicado en el laboratorio a las muestras para aislar o detectar la presencia de Salmonella Enteritidis y Salmonella Tiphymurium.
- 3.6 Resultado(s) Oficial(es): Documento o resultado de una prueba diagnóstica emitido en formato oficial por la red de los Laboratorios de Diagnóstico Veterinario LDV del Instituto Colombiano Agropecuario ICA o Laboratorios autorizados






Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

legalmente para tal fin, cuya muestra necesariamente tuvo que ser tomada por un funcionario oficial o ente autorizado legalmente para tal fin.

- 3.7 Salmonella Enteritidis Tiphymurium (SE ST): La Salmonella Enteritidis Salmonella Tiphymurium pertenecen a la familia enterobacteriaceae, son bacilos Gram Negativos, no esporulados que se encuentran en gran variedad de huéspedes. Son serovares de Salmonella entérica. Estos agentes son reconocidos como una de las causas principales de brotes de Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
- 3.8 Unidad epidemiológica (OIE): Grupo de animales con determinada relación epidemiológica y aproximadamente la misma probabilidad de exposición a un agente patógeno, sea porque comparten el mismo espacio (un corral, por ejemplo), sea porque pertenecen a la misma explotación. Se trata generalmente de un rebaño o de una manada, aunque también pueden constituir una unidad epidemiológica grupos de animales, como aquellos que pertenecen a los habitantes de un pueblo o aquellos que comparten instalaciones zootécnicas. La relación epidemiológica puede variar de una enfermedad a otra, e incluso de una cepa de agente patógeno a otra.
- 3.9 Vacuna viva: Biológico que contiene microorganismos vivos que de alguna manera han sido atenuados para que no induzca enfermedad de manera significativa cuando sea administrado. Son aquellos capaces de replicarse en el animal blanco estimulando la respuesta inmune y generalmente no pueden caracterizarse completamente por test físicos o químicos únicamente. Para el caso de vacunas vectorizadas, se entiende que el vector es el que se replica en el animal blanco.
- 3.10 Vacuna inactivada: Biológico que se compone de microorganismos inactivados, térmica o químicamente, o bien se trata de fracciones o subunidades de los mismos, incapaces de reproducirse y de producir la enfermedad en el huésped o de transmitirse a otro sujeto.

ARTÍCULO 4.- SALMONELLAS PARATÍFICAS. De acuerdo con las consideraciones internacionales de salud pública y comercio internacional, serán consideradas como salmonellas paratíficas, todas las infecciones diagnosticadas en aves de corral cuyo agente etiológico corresponda a Salmonella Enteritidis "SE" y/o Salmonella Tiphymurium "ST".

ARTÍCULO 5.- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL. El Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia para Salmonella Enteritidis "SE" y Salmonella





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

Tiphymurium "ST" en aves de corral, está dirigido a todos los establecimientos avícolas y será desarrollado por el ICA dentro de todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 6.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL Y DISMINUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN. Hacen parte del Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de la infección por Salmonellas Paratíficas (SE y ST) en aves de corral dentro del territorio, los siguientes componentes:

- 6.1 CONSIDERACIONES PARA EL CONTROL Y DISMINUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE INFECCIONES POR SE Y ST EN COLOMBIA. El ICA realizará el control de la SE y ST de acuerdo a las siguientes consideraciones:
  - 6.1.1 Ante toda notificación de cuadro digestivo en aves de corral, se realizará el diagnóstico diferencial de la presencia de infección por SE y ST en predios, al no considerarse un cuadro clínico manifiesto.
  - 6.1.2 La infección solamente será descartada mediante el diagnóstico de laboratorio.
  - 6.1.3 Para el reconocimiento del establecimiento será necesario demostrar la ausencia de la infección o controlar la presencia del patógeno y demostrar la ausencia de excreción bacteriana de acuerdo al plan de muestreos negativos establecido en el numeral 6.2.6 de la presente resolución.
- 6.2 RECONOCIMIENTO POR AUTOGESTIÓN PARA GRANJAS Y/O MODULOS DE MATERIAL GENÉTICO, ENGORDE, LEVANTE, POSTURA, Y PLANTAS DE INCUBACIÓN. Los interesados en obtener el reconocimiento por parte del ICA, como establecimientos libres de SE y ST, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
  - 6.2.1 Contar con RSPP (Registro Sanitario de Predio Pecuario).
  - 6.2.2 Contar con certificado GAB (Granja Avícola Biosegura) vigente.
- 6.2.3 Si es planta de incubación, contar con la respectiva inscripción de la planta de incubación de material genético aviar.
- 6.2.4 Radicar ante la Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el establecimiento, la información de las granjas, módulos, lotes y/o planta de incubación a reconocer, con la información de edades, plan vacunal de Salmonella contra los serovares ST y SE en los casos que se aplique en granja, fechas de encasetamiento de lotes próximos y fechas de monitoreo de acuerdo a las edades establecidas en la tabla 1 de la presente resolución, de acuerdo al formato "Inscripción de granjas y/o módulos de material genético, engorde, levante, postura, y plantas de incubación al






Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

- programa de reconocimiento por autogestión como libre de SE y ST del ICA" Forma 3.
- 6.2.5 Presentar un cronograma de monitoreo con información correspondiente, como mínimo, a seis (6) meses de programación en pollo de engorde y doce (12) meses de programación en aves de largo ciclo, ponedora y material genético, teniendo en cuenta la Tabla 1. de la presente resolución. Dicho cronograma deberá ser actualizado mínimo un (1) mes antes de finalizar la programación anterior.
- 6.2.6 Dar cumplimiento a la totalidad de los muestreos definidos en la siguiente tabla N° 1. "Programa de Monitoreo para reconocimiento de establecimiento libre de SE y ST del ICA":


ESTRATO	EDAD	TIPO DE MUESTRA	NUMERO DE MUESTRAS
Planta de incubación. Aplica para producción local y para huevos fértiles importados.	Cada 90 días por cada lote de reproductoras y abuelas	Huevo picado no nacido.	20 huevos picados no nacidos. Formar 2 pooles (1 pool de higados con vesicula biliar, y 1 pool de bazos y sacos vitelinos).
		Meconio.	Cada pool equivale a 50 ml de meconio, tomados de máximo 20 pollitos recién nacidos.
		Hisopos de arrastre (en caso de no ser posible la obtención de meconio).	Un pool tomado del 20 al 25% de las cajas en las que se transportan las aves de un día.
Granjas/Módulos de reproductoras pesadas/livianas.	1 dia	Tejidos de aves sacrificadas: hígado con vesícula biliar, bazo, saco vitelino.	10 aves. Formar 2 pooles (1 pool de hígados con vesícula biliar y 1 pool de bazos, sacos vitelinos).
		Meconio.	Cada pool equivale a 50 ml de meconio, tomados de máximo 20 pollitos recién nacidos.
		Hisopos de arrastre (en caso de no ser posible la	Un pool tomado del 20 al 25% de las cajas en las que se transportan las aves de un





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

		obtención de meconio).	día.
Granjas/módulos de reproductoras Pesadas/livianas levante.	Sem 11, 22	Hisopos cloacales. Hisopos de arrastre (zapatón).	20 aves agrupadas en 2 pooles de 10 hisopos cada uno (un hisopo por ave).  2 pares, cada par es una muestra.
Granjas/módulos de reproductoras Pesadas/livianas Producción.	Sem 30, 45, 60	Hisopos cloacales.  Hisopos de arrastre (zapatón).	20 aves agrupadas en 2 pooles de 10 hisopos cada uno (un hisopo por ave).  2 pares, cada par es una muestra.
Granjas/módulos de ponedora comercial.	1 día	Tejidos de aves sacrificadas: hígado con vesícula biliar, bazo, saco vitelino.	10 aves. Formar 2 pooles (1 pool de hígados con vesícula biliar y 1 pool de bazos, sacos vitelinos).
		Meconio.	Cada pool equivale a 50 ml de meconio, tomados de máximo 20 pollitos recién nacidos.
		Hisopos de arrastre (en caso de no ser posible la obtención de meconio).	Un pool tomado del 20 al 25% de las cajas en las que se transportan las aves de un día.
Granjas/módulos de ponedora comercial levante.	Sem 8 y Sem 14 a 16 (previo al traslado producción)	Hisopos cloacales.  Piso: Hisopos de arrastre (zapatón).	20 aves agrupadas en 2 pooles de 10 hisopos cada uno (un hisopo por ave).  2 pares, cada par es una muestra.
Granjas/módulos de ponedora comercial levante en jaula.	Sem 8 y Sem 14 a 16 (previo al traslado producción)	Jaula: Hisopos de arrastre (banda de gallinaza) o heces.	






Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

Granjas/módulos de ponedora comercial producción en piso	Sem 30, 50 y 70 (cuando el lote va hasta la sem 80) u 85 (cuando el lote va hasta la sem 100	Hisopos cloacales.  Piso: Hisopos de arrastre (zapatón).	20 aves agrupadas en 2 pooles de 10 hisopos cada uno (un hisopo por ave).  2 pares, cada par es una muestra.
Granjas/módulos de ponedora comercial producción en jaula	Sem 30, 50 y 70 (cuando el lote va hasta la sem 80) u 85 (cuando el lote va hasta la sem 100	Jaula: Hisopos de arrastre (banda de gallinaza) o heces.	2 bandas/naves/galpones o 300 gr de heces/polvo que equivalen a 100 bolos fecales.
Granja/módulo de pollo de engorde	Entre el dia 21 y el dia 28	Hisopos cloacales. Hisopos de arrastre (zapatón).	20 aves agrupadas en 2 pooles de 10 hisopos cada uno (un hisopo por ave).  2 pares, cada par es una muestra.

6.2.7 En caso de que los muestreos ambientales de una granja de postura comercial resulten positivos, se deberá dar cumplimiento a la totalidad de los muestreos definidos en la siguiente tabla N° 2. "Programa de Monitoreo para reconocimiento de establecimiento libre de SE y ST del ICA":

ESTRATO	EDAD	TIPO DE MUESTRA	NUMERO DE MUESTRAS
Granja / Módulo de ponedora comercial positivo al muestreo ambiental.	Cualquier edad que haya resultado positiva	Huevo. (hasta completar 4 muestreos consecutivos negativos con intervalo de 15 días)	5 pooles de 20 huevos cada uno.

PARÁGRAFO 1. Tener en cuenta para los lotes de aves vacunados con biológicos vivos contra SE y/o ST, que el monitoreo se deberá realizar 30 días posteriores a la aplicación de la vacuna.





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

PARÁGRAFO 2. En el caso de lotes vacunados con vacunas vivas de SE y/o ST, en los que se aísle la bacteria, se deberá serotipificar y/o realizar el estudio que el ICA determine necesario para diferenciar si es vacunal o de campo.

**PARÁGRAFO 3.** Una vez radicada la información escrita establecida en el numeral 6.3.4 de la presente resolución, el usuario acepta las condiciones de ingreso al programa en los términos relacionados con muestreos, diagnóstico y control oficial de la enfermedad.

PARÁGRAFO 4. Las muestras serán tomadas por el ICA o a quién este autorice y todos los costos asociados con los materiales para la toma de muestras y el diagnóstico serán asumidos por el usuario.

PARÁGRAFO 5. En caso de importaciones, los establecimientos cuarentenarios serán objeto de muestreo obligatorio de acuerdo a las tablas N° 1 y 2.


PARAGRAFO 6. Para el caso de importaciones el muestreo del primer día de edad será homologado con el muestreo oficial realizado al ingreso de los animales y/o huevos fértiles al país.

PARÁGRAFO 7. El diagnóstico se podrá realizar a través de la Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario del ICA y se hará por pago anticipado por muestra enviada de acuerdo a las tarifas vigentes.

Si el usuario desea utilizar el servicio de un Laboratorio de Diagnóstico diferente al oficial, éste deberá estar reconocido por el ICA según la resolución 3823 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y autorizado para realizar las técnicas diagnósticas de Salmonella dispuestas por el ICA.

PARÁGRAFO 8. Una vez la muestra sea tomada, el ICA o el laboratorio reconocido para tal fin deberá emitir el resultado de presencia o ausencia de Salmonella spp dentro de máximo 7 días calendario contados a partir de la fecha de llegada de la misma al laboratorio de diagnóstico veterinario. En caso de que el resultado sea presencia de salmonella spp la muestra pasará a serotipificación y se deberá emitir el resultado final máximo 5 días calendario contados a partir de la expedición del primero resultado que detectó la presencia.

PARÁGRAFO 9. La información de granjas, módulos y establecimientos que se encuentren incluidos en el programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia para SE y ST serán publicados en la página web del ICA indicando si fue reconocido o no como libre de SE – ST.





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

PARÁGRAFO 10. En ningún caso el usuario podrá solicitar un nuevo muestreo de galpones, módulos, establecimientos o granjas que resulten positivos ya que el diagnóstico se realiza mediante una prueba confirmatoria.

PARÁGRAFO 11. Las granjas, módulos y/o plantas de incubación que obtengan resultados positivos a ST y/o SE, deberán aplicar medidas de gestión de riesgo para la reducción de la presencia de la bacteria en el producto destinado al consumo humano o destino final.

PARÁGRAFO 12. En el caso de obtener resultados positivos a SE o ST la granja no podrá sacar los huevos con destino al consumo humano y solamente se permitirá su salida para procesamiento con destino a ovoproductos garantizando que la temperatura no genere enfermedad en el consumidor.

- 6.3 MEDIDAS DE CONTROL EN GRANJAS Y/O MÓDULOS DE MATERIAL GENÉTICO Y PLANTAS DE INCUBACIÓN POSITIVOS A INFECCIÓN DE SALMONELLA ENTERITIDIS O TIPHYMURIUM. En las granjas y/o módulos de material genético aviar positivos a SE o ST, el ICA procederá a retirar el reconocimiento del establecimiento como libre de SE – ST. Del mismo modo de manera voluntaria el usuario podrá:
- 6.3.1 Establecer un programa vacunal encaminado a la prevención y el control del patógeno en el establecimiento.

PARÁGRAFO. El productor solo podrá ingresar nuevamente al programa de reconocimiento como granja y/o módulo de material genético aviar libre de SE – ST una vez haya obtenido resultados negativos que muestren la eliminación del agente patógeno.

6.4 MEDIDAS DE CONTROL EN GRANJAS Y/O MODULOS DE ENGORDE, LEVANTE Y POSTURA COMERCIAL. De manera voluntaria y en constante supervisión del ICA el usuario podrá implementar medidas de prevención, control, erradicación, autogestión, gestión de riesgos y las demás que considere pertinentes en pro de disminuir la prevalencia de la enfermedad en su establecimiento progresivamente hasta la erradicación.

PARÁGRAFO. Para los sistemas de aves en jaula las medidas de control aplicarán en caso de encontrar el agente en huevos.

6.5 VACUNACIÓN. Todas las personas naturales o jurídicas incluidas dentro del campo de aplicación de la presente Resolución están obligados a cumplir con las siguientes





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

condiciones para el uso y comercialización de las vacunas vivas e inactivadas de Salmonella Enteritidis "SE" y/o Salmonella Tiphymurium "ST".

- 6.5.1 La vacuna debe contar con registro ICA.
- 6.5.2 El uso debe estar enmarcado dentro de un plan vacunal recomendado y verificado por el profesional Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista asistente técnico de la granja, de acuerdo a los POES diseñados para tal fin.
- 6.5.3 Se deben seguir las recomendaciones del laboratorio productor.
- 6.5.4 La vacuna se utilizará acorde con las condiciones aprobadas en el registro ICA.
- 6.5.5 La aplicación del biológico estará bajo responsabilidad del asistente técnico de la granja (médico veterinario o médico veterinario zootecnista).
- 6.5.6 El seguimiento estará a cargo del ICA o quien este autorice para este fin.
- 6.5.7 Las vacunas vivas que se utilicen, no deberán interferir con el diagnóstico.
- 6.5.8 No se podrá realizar la toma de muestra en lotes de aves vacunadas con biológicos vivos contra SE y/o ST sino hasta 30 días posteriores a la aplicación de dicha vacuna.

ARTÍCULO 7.- OBLIGACIONES. El titular del establecimiento avicola reconocido como libre de Enteritidis y Tiphymurium debe cumplir las siguientes obligaciones:

- 7.1 Permitir al ICA el ingreso de sus funcionarios en cualquier momento, para efectuar actividades de inspección, vigilancia control y verificación necesarias, exigiendo el cumplimiento de todas las medidas de Bioseguridad establecidas en la granja.
- 7.2 Notificar al ICA la presencia de cuadros respiratorios, síndromes neurológicos u otros signos clínicos y cuadros compatibles con enfermedades de control oficial.
- 7.3 Aplicar todas las medidas de control y según sea el caso, indicadas en la presente resolución.

**ARTÍCULO 8.- PROHIBICIONES.** El titular del establecimiento avicola reconocido como libre de S. Enteritidis y S. Tiphymurium deberá abstenerse de:

- 8.1 Aplicar cualquier tipo de vacuna contra SE y ST sin cumplir con lo establecido en la presente Resolución.
- 8.2 Usar autovacunas para la prevención y/o control de enfermedades de control oficial.
- 8.3 Aplicar cualquier tipo de vacuna viva contra Salmonella Gallinarum sin cumplir con lo establecido en la normativa vigente de ICA.

ARTÍCULO 9.- CONTROL OFICIAL. Los funcionarios del ICA en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratificas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

Resolución, tendrán el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una copia en el lugar.

ARTICULO 10 -. USO DEL RECONOCIMIENTO ICA. El títular del establecimiento, granja o módulo reconocido por el ICA, podrá plasmar en los empaques de sus productos, la condición de libre de Salmonella Enteritidis y Salmonella Tiphymurium, siempre y cuando dicho reconocimiento se encuentre vigente y publicado en la página web del ICA.

ARTÍCULO 11.- DOCUMENTOS. Se considera parte integral de la presente resolución la forma de "INSCRIPCIÓN DE GRANJAS Y/O MODULOS DE MATERIAL GENÉTICO, ENGORDE, LEVANTE, POSTURA, Y PLANTAS DE INCUBACIÓN AL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO POR AUTOGESTIÓN COMO LIBRE DE SE Y ST DEL ICA" Forma 3.


ARTÍCULO 12.- TRANSITORIO. Todas las granjas y/o módulos de material genético aviar, así como las plantas de incubación en el territorio nacional, tendrán un plazo de 36 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, para obtener el reconocimiento por parte del ICA como libres de Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium.

ARTÍCULO 13.- SANCIONES. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente Resolución será sancionado de conformidad con lo establecido en el Capítulo 10 del Título I de la Parte 13 del Decreto 1071 de 2015, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

ARTÍCULO 14.- VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.,





Por medio de la cual se : "Establece el Programa Nacional de Control y Disminución de Prevalencia de las Salmonellas Paratíficas (Enteritidis y Tiphymurium) en aves de corral dentro del territorio nacional".

Dada en Bogotá a los 05/11/2019

DEYANIDA BARRERO LEON Gerente General

Proyectó: Revisado: Juan Diego Castillo Ortega - Dirección Técnica de Asuntos Nacionales Jorge Enrique Sosa Franco - Dirección Técnica de Sanidad Animal

VoBo:

Alfonso José Araujo Baute - Subgerencia de Protección Animal

Francisco Javier Osorio Martinez - Subgerencia de Regulación Sanitaria y

Fitosanitaria