

# Colombia libre de Peste Porcina Africana

Actualmente hay brotes de peste porcina africana en algunos países de **Asia, Europa y África.**

Esta enfermedad **no representa riesgo para la salud humana, pero puede causar graves pérdidas para la industria porcícola nacional.**

Contribuya a prevenir la llegada del virus de la peste porcina africana, acatando las siguientes recomendaciones:

**01**

No traiga cerdos, ni subproductos de origen porcino de las zonas afectadas. Sí lo hace serán decomisados.

**02**

No ingrese a granjas de cerdos en Colombia, si usted ha visitado previamente fincas o establecimientos que críen cerdos en estas regiones.



# ¿Cómo se transmite la peste porcina africana?

La infección en los cerdos se produce por:

- Contacto directo con porcinos vivos o muertos, domésticos o silvestres infectados.
- Por ingesta de restos de carne porcina infectada o de productos cárnicos porcinos infectados no procesados.
- Por medio de elementos no vivos contaminados como calzado, vestimentas, vehículos, cuchillos y equipos, debido a la gran resistencia ambiental del virus.
- El virus se encuentra en los fluidos orgánicos y tejidos de los cerdos domésticos y silvestres infectados. Además algunos procesos de transformación no destruyen el virus.
- La PPA se transmite también por la picadura de moscas y garrapatas.

